

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70

**EDITION CORSE**
 Bulletin Technique N°123
 du
 15 Juin 1988
VIGNE**** Cochenilles farineuses**

De nombreuses parcelles sont concernées par ce parasite. Si vous avez observé aux vendanges des grappes envahies de cochenilles blanches, collantes et couvertes de fumagine, il faut **traiter** cette semaine.

**** Cicadelles de la Flavescence Dorée**

Le premier traitement contre les cicadelles devra être réalisé dans la semaine du **20 au 27 juin** dans toutes les parcelles concernées.

**** Sphinx de la vigne**

Des attaques de cette grosse chenille (8 à 9 cm) ont été observées sur la plaine orientale. Ces chenilles se reconnaissent également à leur éperon bien développé de couleur claire. Elles sont le plus souvent noires avec des bandes longitudinales de couleur jaune. Les dégâts peuvent être considérables, les chenilles sont très voraces et consomment les feuilles, extrémités de rameaux et jeunes grappes. Surveillez surtout vos jeunes plantations Si vous constatez la présence de ces chenilles il faut traiter **immédiatement**.

Aucun produit n'est homologué contre ce parasite, les insecticides actifs contre les tordeuses de la grappe doivent être normalement efficaces, par exemple : ULTRACIDE, LANNATE, METOVER, TALSTAR, DECIS, TORAK-É, ZOLONE FLO, LARVIN, FASTAC, KARATE, SUMICIDIN 10, EKALUX, et les spécialités à base de parathion, azinphos, methyl, carbaryl, cypermethrine, fenitrothion, malathion.

**** Tordeuses de la grappe**

Le vol de deuxième génération débute à peine.

P. 46

AGRUMES

** Gommose

C'est le moment de traiter. Réalisez une application d'Aliette à 250 g/hl dans les vergers atteints. Mouillez abondamment 1000 à 1200 l de bouillie par ha.

En cas de dégâts graves, renouvelez l'application en septembre.

PECHER

** Plomb parasitaire

Les feuilles atteintes prennent une couleur métallique. L'arbre dépérit progressivement.

Aucun traitement en végétation n'est efficace, mais des mesures prophylactiques peuvent freiner l'extension de la maladie.

- Arracher les arbres morts, supprimer et brûler les parties atteintes des autres arbres.
- Au moment de la taille, taillez les arbres atteints en dernier et mastiquez les plaies de la taille.

=====